

### «Алмадез-профи»

«Алмадез-профи» - готовое к применению дезинфицирующее средство - жидкое мыло, кожный антисептик, предназначен для гигиенической обработки рук и дезинфекции и мытья твердых поверхностей, посуды.

Обладает антимикробной активностью в отношении инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) бактериальной этиологии (тестировано на *Pseudomonas aeruginosa*), грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), возбудителей, кишечных инфекций, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

**Широкая область применения:** используется на всех объектах внутрибольничной среды и на объектах во всех отраслях народного хозяйства!

**Многофункциональное средство – предназначено для:**

**А.** Для гигиенической обработки рук медицинского персонала, санитарной обработки кожи пациента перед оперативными вмешательствами в медицинских (МО) и лечебно-профилактических организациях (ЛПО) любого профиля, включая туберкулезные и инфекционные.

**Б.** Для дезинфекции и мытья твердых поверхностей в помещениях, предметов обстановки, аппаратов, приборов, уборочного инвентаря и материала, резиновых и полипропиленовых ковров, обуви в вышеперечисленных учреждениях при проведении профилактической и текущей дезинфекции при бактериальных и грибковых инфекциях;

**В** Для мытья и дезинфекции различной посуды (в том числе загрязнённой остатками пищи), других ёмкостей на пищеблоках любых организаций, включая МО и ЛПО;

**Г.** Для дезинфекции поверхностей, посуды, рук персонала на любых объектах всех отраслей народного хозяйства.

**Д.** Для применения населением в быту в соответствии с этикеткой для быта.

#### **Состав:**

- полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 0,5 %
- алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,5 %
- 2-феноксиэтанол – 0,5 %
- функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

#### **Преимущества:**

- Пролонгированное антимикробное действие в течение 4 часов;
- Безопасно – 4 класс малоопасных веществ;
- Легко смывается с кожных покровов, обрабатываемых поверхностей, посуды;
- Средство обладает выраженными моющими и дезодорирующими свойствами. Удаляет жировые и пигментирующие загрязнения (в том числе застарелые) на обрабатываемых поверхностях. Моющая способность средства более 95%.
- не вызывает аллергических реакций;

- подходит для частой повседневной обработки, т. к. содержит специальные добавки, смягчающие, увлажняющие и восстанавливающие кожу рук;
- не требует смывания с обработанных поверхностей (кроме поверхностей, контактирующих с посудой, продуктами питания);
- Сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.
  - Срок годности средства 6 лет

#### Характеристики:

##### Форма выпуска:

полимерные флаконы вместимостью от 0,05 до 1,5 дм<sup>3</sup>, в том числе с дозирующими устройствами (дозатор-помпа и дозатор-насос),  
канистры полимерные вместимостью от 1,5 дм<sup>3</sup> до 50 дм<sup>3</sup>,  
бочки полиэтиленовые вместимостью 50-200 дм<sup>3</sup>, флаконы с евродозаторами (эйрлесс) вместимостью 0,5 и 1 дм<sup>3</sup>.

Флакон 1л подходит под все виды локтевых дозаторов.

Канистра 5л может снабжаться помпой-дозатором на 30 мл жидкости.

Хранение от -40°С до +40°С.

Транспортировка – не требует теплых вагонов, сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания

#### ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И КОЖИ ПАЦИЕНТА.

| Вид обработки рук, кожи пациента                       | Количество средства ( мл)            | Время обработки |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Гигиеническая обработка                                | 3 ( однократно)                      | 30 сек          |
| Гигиеническая обработка перед хирургической обработкой | 3 ( однократно)                      | 1 мин           |
| Санитарная обработка кожных покровов                   | Мочалка, обильно смоченная средством | 1мин            |

#### ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБУВИ И ПОСУДЫ

| Объект дезинфекции                                                                                                                                | Режим дезинфекции                              | Концентрация (%) | Экспозиция (мин) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Поверхности в помещениях, на санитарном транспорте, предметы обстановки, жёсткая мебель, наружные поверхности приборов, медицинского оборудования | Бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые  | 1%               | 60               |
|                                                                                                                                                   |                                                | 2%               | 30               |
|                                                                                                                                                   |                                                | 3%               | 15               |
| Внутренняя поверхность обуви ( протирается дважды тампоном или марлевыми салфетками, обильно смоченными средством)                                | Бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые  | 1%               | 60               |
|                                                                                                                                                   |                                                | 2%               | 30               |
|                                                                                                                                                   |                                                | 3%               | 15               |
| Посуда, в том числе загрязнённая остатками пищи                                                                                                   | Бактериальные ( кроме туберкулеза) и грибковые | 2%               | 60               |
|                                                                                                                                                   |                                                | 3%               | 30               |